



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Sciences

Science

Région des Maritimes

Secrétariat canadien de consultation scientifique
Réponse des Sciences 2014/018

TENDANCES DANS LES RELEVÉS PAR NAVIRE SCIENTIFIQUE DANS LA RÉGION DES MARITIMES – BANC GEORGES




Figure 1 : Sous-divisions des zones de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest.

Contexte

Pêches et Océans Canada (MPO) effectue des relevés par navire scientifique selon un protocole normalisé dans la région des Maritimes. Des relevés sont faits l'hiver dans la division 5Z de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (banc Georges; figure 1) depuis 1987. Les résultats obtenus nous renseignent sur les tendances de l'abondance des espèces de poissons de fond dans la région des Maritimes. Si les résultats de ces relevés reflètent les tendances de la biomasse et de l'abondance et constituent un élément essentiel des évaluations scientifiques des stocks, une évaluation intégrale qui fait appel à d'autres sources de données est toutefois nécessaire pour évaluer les effets des mesures de gestion sur l'état des populations. La Gestion des pêches et de l'aquaculture a demandé que l'on procède à un examen des données des relevés hivernaux du MPO dans les sous-divisions 5Z1-5Z4 (figure 2) portant sur les espèces suivantes : morue, aiglefin, goberge, hémitriptère atlantique, loquette d'Amérique, limande à queue jaune, loup atlantique, baudroie, raie à queue de velours, raie épineuse, grande raie, raie tachetée et raie hérisson. L'information provenant des relevés sera utilisée par la Gestion des pêches et de l'aquaculture comme base de discussion avec divers membres concernés de l'industrie, en vue de recommander des mesures de gestion et de déterminer quels stocks devraient être examinés plus en détail en 2014.

La présente réponse des Sciences découle du processus de réponse des Sciences du 18 décembre 2013 sur l'Examen des tendances dans les relevés par navire scientifique dans la région des Maritimes.

Renseignements de base

Le relevé par navire scientifique sur le banc Georges (5Z) a lieu tous les hivers depuis 1987 en suivant un processus de stratification normalisé. Dans le cadre de ce relevé, réalisé selon un plan d'échantillonnage aléatoire stratifié, on prélève des échantillons de poissons et d'invertébrés à l'aide d'un chalut de fond à panneaux. Les résultats de ces relevés constituent la principale source de données pour la surveillance des tendances de la répartition, de l'abondance et de la condition biologique des espèces échantillonnées sur le banc Georges (pour obtenir plus de renseignements, consulter Stone et Gross, 2012).

Les relevés au chalut de fond ont été conçus de manière à obtenir les tendances de l'abondance des poissons et des invertébrés à des profondeurs se situant entre 30 m et 200 m. On s'attend à ce que les indices de ces relevés soient proportionnels à l'abondance de la plupart des espèces.

Les limites des strates pour la division 5Z sont indiquées à la figure 2. Des activités d'échantillonnage ont été menées dans les strates 5Z1 à 5Z4, 5Z8 et 5Z9 en 2013. Les tendances de la répartition sont présentées pour la totalité des espèces faisant l'objet d'un relevé. Les tendances des indices de la biomasse sont présentées pour les strates 5Z1 à 5Z4. Les fréquences de longueur des captures des relevés de 2012 et 2013 sont comparées à la moyenne à long terme (1987-2011) et sont également incluses pour les stocks sélectionnés.



Figure 2. Strates du relevé d'hiver par navire scientifique sur le banc Georges (5Z).

Analyse

Les indices de la biomasse dérivés du relevé de la série chronologique (et non ceux de la biomasse totale) sont comparés aux moyennes d'un ensemble de périodes afin d'obtenir un contexte historique pour les niveaux de biomasse. Les périodes utilisées sont une moyenne à court terme sur 5 ans (2008-2012) et la moyenne à long terme (1987-2012) des relevés. Les renseignements sur les méthodes de calcul de ces indices sont donnés dans l'ouvrage de Stone et Gross (2012).

Morue franche




Figure 3a. Répartition des captures de morue franche durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 3b. Indices de la biomasse des captures de morue franche dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 3c. Indices des fréquences de longueur des captures de morue franche dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Aiglefin




Figure 4a. Répartition des captures d'aiglefin durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 4b. Indices de la biomasse des captures d'aiglefin dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 4c. Indices des fréquences de longueur des captures d'aiglefin dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Goberge




Figure 5a. Répartition des captures de goberge durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 5b. Indices de la biomasse des captures de goberge dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 5c. Indices des fréquences de longueur des captures de goberge dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Merluche blanche




Figure 6a. Répartition des captures de merluche blanche durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 6b. Indices de la biomasse des captures de merluche blanche dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 6c. Indices des fréquences de longueur des captures de merluche blanche dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Limande à queue jaune




Figure 7a. Répartition des captures de limande à queue jaune durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 7b. Indices de la biomasse des captures de limande à queue jaune dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 7c. Indices des fréquences de longueur des captures de limande à queue jaune dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Raie à queue de velours




Figure 8a. Répartition des captures de raie à queue de velours durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 8b. Indices de la biomasse des captures de raie à queue de velours dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 8c. Indices des fréquences de longueur des captures de raie à queue de velours dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Raie épineuse




Figure 9a. Répartition des captures de raie épineuse durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 9b. Indices de la biomasse des captures de raie épineuse dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 9c. Indices des fréquences de longueur des captures de raie épineuse dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Grande raie




Figure 10a. Répartition des captures de grande raie durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 10b. Indices de la biomasse des captures de grande raie dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 10c. Indices des fréquences de longueur des captures de grande raie dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Raie tachetée

La raie tachetée et la raie hérisson ne peuvent être différenciées avec certitude quand elles mesurent moins de 40 cm. Étant donné que la majorité des raies tachetées et des raies hérissons capturées lors des relevés appartiennent à cette catégorie, les poissons dont l'identification est incertaine influencent les données des tendances de la biomasse (pour plus de renseignements, consulter McEachran et Musick, 1973).




Figure 11a. Répartition des captures de raie tachetée durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 11b. Indices de la biomasse des captures de raie tachetée dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 11c. Indices des fréquences de longueur des captures de raie tachetée dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Raie hérisson




Figure 12a. Répartition des captures de raie hérisson durant le relevé par navire scientifique de l'hiver 2013. Les zones n'ayant enregistré aucune prise sont marquées d'un symbole « + ». Les cercles noirs représentent des prises. Les cercles sont proportionnels aux tailles des prises.




Figure 12b. Indices de la biomasse des captures de raie hérisson dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les indices sont représentés par la ligne pleine noire. La ligne bleu foncé représente la moyenne à long terme des relevés (1987 à 2012). La ligne bleu pâle représente la moyenne à court terme sur 5 ans (2008 à 2012).




Figure 12c. Indices des fréquences de longueur des captures de raie hérissée dans les strates 5Z1 à 5Z4 d'après le relevé d'hiver par navire scientifique. Les barres rouges pleines représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2013. Les barres vertes vides représentent le nombre de poissons en milliers selon la longueur, enregistrés durant le relevé de 2012. La ligne bleue pleine représente le nombre moyen (en milliers) de poissons selon la longueur, enregistrés durant la période de 1987 à 2011.

Conclusions

Les indices de la biomasse d'après le relevé d'hiver par navire scientifique ont été comparés aux moyennes à court terme (2008-2012) et à long terme (1987-2012). Les fréquences de longueur pour 2012 et 2013 ont été comparées aux moyennes à long terme (1987-2011).

Collaborateurs

Donald Clark	MPO, Sciences – Maritimes
Tara McIntyre	MPO, Sciences – Maritimes
Jamie Emberley	MPO, Sciences – Maritimes
Verna Docherty	MPO, Gestion des pêches et de l'aquaculture
Christie Whelan	MPO, Sciences – Maritimes
Lottie Bennett	MPO, Sciences – Maritimes
Heath Stone	MPO, Sciences – Maritimes
Kirsten Clark	MPO, Sciences – Maritimes

Approuvé par :

Alain Vézina
Directeur régional des Sciences, Région des Maritimes
Pêches et Océans Canada
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Tél. : 902 426-3490

Date : Le 20 décembre 2013

Sources de renseignements

- McEachran, J.D., and Musick, J.A. 1973. Characters for Distinguishing Between Immature Specimens of the Sibling Species, *Raja erinacea* and *Raja ocellata* (Pisces: Rajidae). *Copeia* 1973: 238-250.
- Stone, H.H., and Gross, W.E. 2012. Review of the Georges Bank Research Vessel Survey Program, 1987-2011. *Can. Manuscr. Rep. Fish. Aquat. Sci.* 2988.

Le présent rapport est disponible auprès du :

Centre des avis scientifiques (CAS)
Région des Maritimes
Pêches et Océans Canada
CP 1006, succursale B203
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Canada B2Y 4A2

Téléphone : 902 426-7070
Télécopieur : 902 426-5435

Courriel : XMARMRAP@mar.dfo-mpo.gc.ca
Adresse Internet : www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/

ISSN 1919-3815

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2014



La présente publication doit être citée comme suit :

MPO. 2014. Tendances dans les relevés par navire scientifique dans la région des Maritimes – banc Georges. *Secr. can. de consult. sci. du MPO, Rép. des Sci.* 2014/018.

Also available in English :

DFO. 2014. *Maritimes research vessel survey trends on Georges Bank. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci. Resp.* 2014/018.